

Curiosidades - Sapinho Pingo-de-Ouro

Escrito por Administrator

Qui, 07 de Abril de 2011 00:57 - Última atualização Qua, 06 de Abril de 2016 16:20

Taxonomia:

Filo: Cordados



Sub-Filo: Vertebrados

Super-Classe: Tetrápodo

Classe: Lissamphibia

Sub-Classe: Diapsida

Super-Ordem: Salientia

Ordem: Anura

Família: Brachycephalidae

Gênero: *Brachycephalus*

Espécie: *Brachycephalus ephippium* (Spix, 1824)

Nome Popular:

Sapinho dourado, Pingo-de-ouro, Botão-de-ouro.

Distribuição:

São bastante abundantes nas matas da Serra do Mar e da Mantiqueira, na região de Campinas é encontrado em áreas florestais do planalto, em altitude superior a 1000 m (Carvalho-e-Silva & Izecksohn, 2001). Ocorre desde a Bahia até o Paraná (Frost, 2002).

Características:

É um sapo de pequeno porte podendo ser alaranjado ou amarelo-cromo, possui cerca de 2 cm de comprimento do focinho ao ânus e apenas dois dedos funcionais na mão e três artelhos no pé (Carvalho-e-Silva & Izecksohn, 2001). Caminham lentamente de modo característico, dificilmente pulam, possuem a cor vistosa, o que pode estar associado à presença de substância tóxica na pele, semelhante a tetrodotoxina, que possivelmente tem função defensiva contra predadores (Sebben et al. 1986).

Curiosidades - Sapinho Pingo-de-Ouro

Escrito por Administrator

Qui, 07 de Abril de 2011 00:57 - Última atualização Qua, 06 de Abril de 2016 16:20

Status Populacional:

Aparentemente não possui risco de desaparecimento, pelo menos enquanto forem preservadas as matas úmidas. No entanto sua população pode entrar em declínio se houver redução da cobertura vegetal, ocasionada por



desmatamentos (Carvalho-e-Silva & Izecksohn, 2001).

Hábitos:

O *Brachycephalus ephippium* pode ser observado tanto durante o dia quanto a noite, andando no chão da mata ou em bromélias. Possui hábitos diurnos, e às vezes são encontrados em grupos, em manhãs ensolaradas, depois de fortes chuvas de verão. Os machos vocalizam sobre serrapilheira (Haddad & Sazima 1992).

Alimentação:

Até o presente momento, não houve estudos sobre a dieta de *Brachycephalus ephippium*.

Reprodução:

A desova é terrestre, composta de poucos ovos despigmentados e ricos em reserva nutritiva, vitelo. Os ovos são colocados em pequenas cavidades no solo, sob folhijo, e recobertos por detritos ou terra (Haddad & Sazima, 1992).

Fotos:

Reinaldo de Medeiros JR